commun sur ce site) pour essayer de trouver ce petit Cléride. Malheureusement je n'ai pu le retrouver, par contre son "cousin" *Thanasimus formicarius* abondait sur toutes les grumes.

Si vous inspectez un jour des grumes de conifères soyez vigilant car cette petite espèce mérite que l'on si intéresse.

Le 19 juin 2001, j'observais dans une de mes cages d'élevages un Cleridae fort intéressant : ***Opilo pallidus***.

Ce dernier provenait d'une branche de chêne de 6 à 8 cm de diamètre récoltées à Lempdes. Cette branche était tombée du houppier de l'arbre très récemment, à la suite d'un gros orage. Ce rare Cleridae vit dans les cimes des vieux chênes et passe ainsi souvent inaperçu. La mise en élevage de branches tombées semble être un moyen efficace pour le capturer.

Ouvrage consultés :

Du Chatenet (G), 2000. — Coléoptères phytophages d'Europe- Editions NAP, 359p.

Gerstmeier (R). — Illustrated Key to the Cleridae of the Western Palaearctic.

Arvernsis , n° 21-22 (2002) : 4

Athous (Haplatous) villiger

(Mulsant et Guillebeau)

Nouvelle localité pour l'Auvergne

(Coléoptère Elateridae)

P. FIEVET "Vindiollet" 63270 SALLÈDES

Cet été, j'ai prospecté le massif de la forêt d'Ayguebonne (commune de Vollore-Montagne, Puy-de-Dôme). Au cours de ces recherches, j'ai capturé cinq mâles et une femelle d'*Athous villiger*. Espèce du Massif central, elle est signalée dans le Puy-de-Dôme de "Les Crocs" et de Montoncel.

Cet Haplatous est relié directement à *pallens* (Mulsant et Guillebeau), *flavipennis* (Candèze), *zebei* (Bach), *laticornis* (Boubers et Leseigneur) qui sont quatre espèces alpines.

Bibliographie. _ Leseigneur L. (1972) Coléoptère Elateridae de la faune de France continentale et de Corse.

Arvernsis , n° 21-22 (2002) : 5-7

Quelques espèces de Cerambycidae intéressantes pour le département du Puy-de-Dôme capturés au cours de l'année 2001

Benjamin Calmont

Pidonia lurida (Fabricius, 1792)

Cette espèce floricole fréquente les forêts humides de montagne. Dans le puy de Dôme, elle a était trouvée par M. Lacoste Frédéric au Mont Dore le 18/08/1996. J'ai vue pour ma part sur une ombellifère un exemplaire dans la vallée de Chaudefour le 22/07/01. Je n'ai malheureusement pas pu l'attrapé, ce dernier ayant été plus vif que moi.

Cortodera humeralis (Schaller, 1783)

L'adulte est floricole, on le rencontre sur les fleurs et feuilles de chêne et d'aubépine. On peut l'obtenir d'élevage à partir de larves récoltées dans du bois décomposé de chêne. J'ai trouvé un exemplaire posé sur une feuille de noisetier le 29/05/01 à Pechadoire dans les gorges de la Sioule (Pontgibaud).

Isarthron fuscum (Fabricius, 1787)
Espèce nouvelle pour le département
Synonyme: *Tetropium fuscum*

Cette espèce aux mœurs discrètes reste cachée le jour et n'est en activité qu'à la tombée de la nuit. Elle est à rechercher sur les grumes d'épicéas et de pins, dans les infractuosités des écorces ou sous celles-ci. L'inspection de grumes le soir à la lampe peut permettre de découvrir cette espèce (attention il s'agit d'une espèce très vive).

Dans notre département j'ai obtenu cette espèce d'élevage ex larva récoltées sous écorces de pins à Lempdes (Puy de Bâne) le 20/01/01.

Molorchus umbellatarum (Schreber, 1759)
Synonyme: *Graphyra umbellatarum*

Cette espèce floricole se rencontre essentiellement sur les ombellifères, les aubépines et les ronces. On peut obtenir les adultes en mettant en élevage des branches et branchettes de Prunus, Malus ou Cratægus.

Dans notre département j'ai trouvé cette espèce en très grand nombre du 12/06/01 au 09/07/01 à Lempdes sur ombellifères.

Clytus tropicus (PANZER, 1795)

Cette rare espèce se trouve dans les forêts de chêne, on la rencontre généralement sur les chênes mourrant ou abattus, les tas de bûches. *Clytus tropicus* est une espèce que l'on peut capturer au piège alimentaire.

Cette espèce a été prise en forêt de Randan 07/2000 (Aude BEAUGER) et je l'ai trouvé en compagnie de Philippe Bachelard le 23/05/01 près d'Orléat (Les Girauds-Faure) sur un bûcher de chêne.

Plagionotus floralis (PALLAS, 1773)
Espèce nouvelle pour le département
Synonyme : *Echinocerus floralis*

Cette jolie espèce floricole se rencontre sur les ombellifères, les euphorbes. Dans le département la larve doit se développer dans les *Medicago sativa* et *Achillea millefolium*.

Plagionotus floralis possède une répartition plutôt méditerranéenne. J'ai pourtant eu la grande chance de voir tomber un individu mort en battant des branches de chêne au bois d'Heurs (Saint Jean d'Heurs) le 03/09/01. Il serait intéressant de rechercher activement cette espèce dans ce bois en juin-juillet.

Acanthocinus griseus (FABRICIUS, 1792)
Espèce nouvelle pour le département

Cette espèce se développe sur les pins, on peut la rencontrer d'avril à septembre sur les pins mourrant ou abattus. On peut trouver *Acanthocinus griseus* en battant les pins morts, mais on peut aussi le capturer en utilisant des pièges interception amorcés avec de l'essence de térébenthine.

J'ai obtenu un individu provenant d'élevage ex-larva récoltés sous écorces de pins, à Lempdes (puy de Bâne) le 08/08/01.

Saperda octopunctata (SCOPOLI, 1772)

On peut rencontrer cette rare Saperde sur les tilleuls, les trembles (généralement sur les arbres âgés, mort ou mourrant). Les larves se développent sous l'écorce de ces mêmes arbres. Cette espèce vient à la lumière ce qui est un bon moyen pour la capturer.

J'ai obtenu deux individus issus d'élevage ex-larva récoltées sur tremble, l'un provenant de Dallet et l'autre du château Chadieu (Authezat).

Les deux individus proviennent donc des bords de l'Allier ; si vous vous promenés le long de ce dernier de mai à juillet n'hésitez pas à inspecter les troncs des trembles tombés au sol.

Stenostola dubia (LAICHARTING)
Espèce nouvelle pour le département

Cette espèce se rencontre dans les bois humides, généralement en bordure de chemin. Les larves se développent dans les tilleuls, les noisetiers, les aulnes.

Dans le département j'ai rencontré deux individus. L'un au bois d'Ornon (Lezoux) le 25/05/01 posé sur une feuille de tilleul et l'autre à Lalong (Teilhède) le 29/05/01 posé sur une feuille de noisetier.

Oberea pupilliata (GYLLENHAL, 1817)

Cette rare espèce se trouve sur les chèvrefeuilles dans lesquels se développent les larves.

J'ai capturé un individu au vol le 20/10/00 à Aydat.

Oberea linearis (LINNÉ, 1761)

Cet élégant longicorne se rencontre sur les noisetiers en juin-juillet. Les individus sont généralement sur la face inférieure des feuilles et sont ainsi facilement repérable. Attention ils sont très prompt à se laisser tomber et à s'envoler au cours de la chute. On peut facilement les obtenir d'élevage, car les dégâts des larves sont bien visibles. On repère facilement la présence des larves dans les branchettes de 4-5 mm car l'extrémité de ces dernières sèches et forme une petite crosse.

En auvergne je n'ai malheureusement rencontré pour le moment cette intéressante espèce uniquement à Mezel de la mi-juin à la mi-juillet.

BIBLIOGRAPHIE

BINON (M), DUFOUR (A), HENGOAT (J-J). — Inventaire des longicornes (Coleoptera Cerambycidae) du département de l'allier (France) - *Revue Scientifique du Bourbonnais,* 27p.

DU CHATENET (G). — Coléoptères phytophages d'Europe - Editions NAP, 359p.

HOLLIGER (B), BRUSTEL (H). — Inventaire Floristiques et Faunistiques d'Ariège n° 11D - Atlas préliminaires des Coléoptères - Coléoptères Cerambycidae, *Edition de l'Association des Naturalistes d'Ariège,* 80p.

VALLADARES (L). - Exploration et caractérisation de méthodes de piégeage adaptées aux coléoptères saproxyliques en forêts feuillues, mixtes ou résineuses - Diplôme d'Etudes Supérieures Universitaires, soutenu le 29 septembre 2000.

VILLIERS (A.), 1978. - Faune des Coléoptères de France I - Cerambycidae. Encyclopédie Entomologique -XLII, Edition Lechevalier, Paris, 611p.