Arvernsis (2005), 33-34 : 3-7

Observations en 2004 de quelques Lépidoptères nouveaux ou peu communs en Auvergne

Philippe BACHELARD[*] *& François FOURNIER*[**]

[*] *Le Monteillet, 63210 Olby <pbachelard@shnao.net>*
[**] *25 rue de la Treille, 63000 Clermont-Ferrand*

L'année 2004 fut dans l'ensemble assez décevante, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, en dehors de l'abondance de *Gonepteryx cleopatra* L. mentionnée dans le numéro précédent de la revue (Fournier, 2004).

La liste suit la numérotation de la liste Leraut (1997).

Papilionidae

3293d. *Parnassius mnemosyne montdorensis* Kolar
Puy-de-Dôme : une ♀ le 30 juin 2004 à proximité du *col de la Ventouse* (Aydat) et quelques individus à *Redondel* (Égliseneuve-d'Entraigues) le 6 juin 2004 (PB).
Cantal-Aveyron : le 18 juin 2004, plusieurs imagos sur les communes de Lacalm et de la Trinitat (PB).

Pieridae

3307. *Pieris mannii* Mayer
Puy-de-Dôme : Après des années de vaines recherches dans des biotopes *a priori* favorables, c'est le hasard qui a permis de trouver cette espèce à Chambon-sur-Lac, le long de la route qui monte au *col de la Croix Morand*. Occupé à réaliser des observations systématiques dans le cadre de l'atlas départemental, l'un d'entre-nous (FF) a eu la chance d'observer une ♀ en train de butiner le 31 juillet 2004. Il faut donc toujours être persévérant : cela faisait plus de 20 ans que cette piéride était recherchée dans le département.

3310. *Pontia daplidice* L.
Puy-de-Dôme : un imago aux environs du *puy Mardoux* (la Ro-

© Association entomologique d'Auvergne

che-Blanche) le 7 août 2004 (PB).

Nymphalidae

3416. *Erebia epiphron* mixta Lesse

Puy-de-Dôme : un exemplaire entièrement noir a été observé le 1er août 2004 à Chambon-sur-Lac, au *puy de Surain* (FF).

3441. *Erebia neoridas* Boisduval

Puy-de-Dôme : cette espèce citée par Guillemot (1857) de Royat et de *Gravenoire*, puis par Beaulaton (1971) de Saint-Pierre-Colamine, avait été observée au-dessus d'Anzat-le-Luguet par C. Tautel. Les recherches dans ces sites étaient restées vaines ces 20 dernières années, alors que sa présence dans le Cantal et la Haute-Loire était connue. Début septembre 2004, deux biotopes très restreints où vole l'espèce ont été trouvés (FF) : l'un à Apchat (750 m d'altitude), à la limite du département de la Haute-Loire, l'autre à Anzat-le-Luguet vers *le Prassinet* (1000 m d'altitude). Ces deux biotopes sont des versants exposés au sud et à végétation plutôt xérothermique.

3464. *Apatura iris* L.

Puy-de-Dôme : le 1er août 2004, parti rechercher des femelles d'*Erebia cassioides* (pour en réaliser l'élevage) au *puy de la Tache*, au-dessus du *col de la Croix Saint-Robert*, à 1650 m d'altitude, un ♂ d'*Apatura iris* L. a été observé planant au sommet en compagnie de *Papilio machaon* L. (FF). Si cette espèce apprécie de voler sur les sommets, elle ne dépasse que rarement 1000 m d'ordinaire.

Lycaenidae

3333. *Satyrium w-album* Knoch

Puy-de-Dôme : observations d'individus isolés au *vallon des Bouys* (Mirefleurs) et à *Arvie* (Ardes) le 7 août 2004, ainsi que sur la commune d'Olby, le 9 juillet 2004 (PB).

3334. *Satyrium pruni* L.

Puy-de-Dôme : un imago au *vallon des Bouys* (Mirefleurs) le 30 juin 2004 (PB).

3343. *Lycaena dispar* Haworth.

Puy-de-Dôme : l'espèce poursuit son extension toujours en petites colonies. Elle a été rencontrée à Gignat le 20 août 2004 et à Usson le 21 août 2004 (FF). Deux imagos également le 12 juin 2004 à *Arvie* (Ardes, PB).

3360. *Scolitantides orion* Pallas

L'espèce semble de plus en plus souvent observée dans notre région et de nouveaux biotopes ont été découverts encore cette année.

Puy-de-Dôme : après la redécouverte de l'espèce à Thiers, il semblait intéressant de chercher d'autres sites dans la vallée de la Dore : cet effort a été récompensé par la découverte de ce Lycène à Olliergues (BD) et au barrage de Sauviat (FF). Également à Bansat le long du ruisseau, à Champeix sur la route de Neschers, et à Orbeil au-dessus du *domaine de Moidas* (Sauvagnat-Sainte-Marthe) (FF). L'espèce a été retrouvée dans les gorges de Ceyrat (LD) et dans la *vallée de la Morge* le 19 mai 2004 (PB). Sur le premier site, la dernière observation datait de 1966 (*in* coll. D. Faïn) et pour la Morge de 1981 (*in* coll. J. Barthélémy).

Cantal : bord du Lot (Cassaniouze) (FF).

Geometridae

Boudinotiana touranginii Berce

L'espèce a été rencontrée dans plusieurs nouveaux sites, toujours localisé sur le cours de l'Allier.

Puy-de-Dôme : vers le pont sur l'Allier à Joze, à *Tissonnières* mais aussi à Maringues le 18 mars 2004 (FF).

Haute-Loire : à Fontanes, au *pont de Lamothe* le 28 mars 2004 (FF).

3706. *Eppirhoe pupillata* Thunberg

Cantal : quelques exemplaires trouvés au *Vial* (Ségur-lès-Villas) à 1200 m (PB).

3887. *Eupithecia pauxilaria* Boisduval

Puy-de-Dôme : lors d'une chasse à *Gergovie* réalisée par C. Tautel et l'un d'entre-nous (FF) le 19 août 2004, un exemplaire a été attiré à la lumière. Cette espèce n'était citée du Puy-de-Dôme que du Mont-Dore, d'après Guillemont dans le catalogue Lhomme (sous le nom d'*Eupithecia euphrasiata* H.-S.), mais pas dans son propre catalogue (1854), ni dans son premier supplément (1857) ! D'où vient cette donnée récupérée par Lhomme ? La collection de Guillemot existait-elle encore ? Son unique descendant n'a aucune indication concernant le destin de cette collection.

Notodontidae

4161. *Odontosia carmelita* Esper
Puy-de-Dôme : un exemplaire a été observé le 18 mai 2004 à la *narse d'Espinasse*, à Saulzet-le-Froid (FF).

Noctuidae

4269. *Zanclognatha lunalis* Scopoli
Puy-de-Dôme : cette espèce capturée par Anglard à Randan, ne semble pas avoir été citée depuis du département ; elle a été observée le 26 juin 2004 à Bansat (FF)

4393. *Earias clorana* L. forme *hemixantha* de Joannis
Puy-de-Dôme : un exemplaire de cette forme peu courante figurée par Seitz (1907) a été trouvée (FF) à Saulzet-le-Froid, à la *narse d'Espinasse* le 17 juin 2004.

4454. *Viminia menyanthidis* Esper
Cantal : un exemplaire attiré à la lumière le 18 juin 2004 dans la tourbière du *puy d'Aubraquet* (Jabrun et Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues) (PB). À notre connaissance, l'espèce n'avait jamais été signalée dans l'Aubrac.

4539. *Meganephria bimaculosa* L.
Puy-de-Dôme : un exemplaire de cette espèce peu citée a été capturé le 5 septembre 2004 à *Gergovie* (la Roche-Blanche) (FF).

4622. *Cuccullia absinthii* L.
Cantal : trois chenilles observées fin août au *col de Malmouche* (Landeyrat) (PB).

4677. *Celaena leucostigma* Hübner
Puy-de-Dôme : un imago le 8 septembre dans la *Réserve naturelle des Sagnes de la Godivelle* (commune éponyme) (PB).

4685. *Hydraecia micacea* Esper
Puy-de-Dôme : deux imagos le 8 septembre dans la *Réserve naturelle des Sagnes de la Godivelle* (commune éponyme) (PB).

4738. *Hyppa rectilinea* Esper
Cantal : un exemplaire attiré à la lumière le 18 juin 2004 dans la tourbière du *puy d'Aubraquet* (Jabrun et Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues) ; même remarque que pour *A. menyanthidis*.

Lemoniidae

3235. *Lemonia dumi* L.
Puy-de-Dôme : ce papillon toujours très difficile à attraper étant

donné son vol rasant et très rapide, n'a pas failli à sa légende ; si un exemplaire a été observé à Solignat au *puy d'Ysson* le 24 octobre 2004, sa capture s'est avérée impossible (FF). Cette citation reste intéressante car peu de biotopes abritant l'espèce ont été recensés : *Gergovie* (Beaulaton), Jussat (FF) et *Piboulet* (Sauviat) (*in* coll. J. Barthélémy). ❑

Remerciements.— Les données complémentaires permettant d'enrichir la connaissance de la faune de la région nous ont été aimablement fournies par Lionel Desbordes (LD), Claude Tautel (CT) et Bruno Dauget (BD).

Références bibliographiques

Seitz A. (1907). *Les macrolépidoptères du globe. Faune paléarctique. Vol. III, Noctuides*. Fritz Lehmann édit., Stuttgart, 511 p.

Leraut P. (1997). Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse. 2ème édition. Supplément à *Alexanor*, Paris, 526 p.

Fournier F. (2004). Abondance exceptionnelle de *Gonepteryx cleopatra* L. en Auvergne en 2004. *Arvernsis*, 31-32 : 26-28.

Fournier F. (à paraître). *Boudinotiana touranginii* (Berce 1870) en Auvergne. *Alexanor*.

•••

E. Boitier

▶ *Scolitantides orion*
mai 2003
Saurier
(Puy-de-Dôme)