Hyménoptères prédateurs IBISCA AUVERGNE année 2008

(Hymenoptera)

Patrick Burguet

18 rue Massaud F-63118 Cébazat

Dans le cadre de l'opération IBISCA AUVERGNE, la Société d'histoire naturelle Alcide d'Orbigny s'est vu confier entre autres missions, l'étude des hyménoptères prédateurs. J'ai donc été chargé d'organiser la pose et le fonctionnement des dispositifs d'échantillonnage. Six familles d'hyménoptères prédateurs ont été traitées : Les Pompilidae étudiés par Frédéric Durand et qui feront l'objet d'un autre article.

J'ai pour ma part traité cinq familles : Crabronidae, Ampulicidae, Sphecidae, Vespidae, Chrysididae. Ces derniers, ainsi que les Eumelinae (Vespidae) ont été triés, dénombrés et préparés mais qui n'ont pas fait l'objet d'identification spécifique, pas plus que de commentaires.

Les Vespinae (Vespidae) sont pour leur part, dénombrés et identifiés, sans plus d'observations particulières.

Généralités, conventions

Le tableau global indique les dates pour chaque piège et le nombre de spécimens récoltés pour les familles étudiées ici. Les points d'interrogation concernent des récoltes qui n'ont pu être examinées, car le 25 octobre 2009 elles ne sont pas revenues du tri des diptères.

Les conventions pour les noms des emplacements sont celles adoptées pour ce protocole: Les sites portent des noms de villes, chaque continent étant associé à un type de milieu.

Pour cet article, nous avons préféré le terme sciaphile à celui d'ombrophile. En effet, l'ensemble de la région est exposé à la pluie de ma-

nière égale, par contre les parcelles concernées par cette dénomination, exposées au nord sont plus ombrueuses, donc plus propices aux espèces sciaphiles et en l'occurrence plus hostiles aux espèces étudiées ici, assez fortement héliophiles.

Méthodologie

Les récoltes ont été effectuées à l'aide de dispositifs de type Malaise, relevés chaque quinzaine. Le tableau global donne le détail des dates pour chaque site. L'emplacement et la disposition des pièges ont suivi le protocole général. Ce protocole est une méthodologie standardisée pour une étude très généraliste portant sur de nombreuses familles

de la faune et de la flore, mais non optimisée pour les hyménoptères. Il permet une reproductibilité dans le temps et sur d'autres lieux, par du personnel non spécialisé.

Toutefois, à défaut de pouvoir être placés aux endroits les plus propices à l'échantillonnage des familles étudiées ici, les pièges ont respecté au moins la règle d'une orientation approximative au sud-ouest. Dans la mesure du possible, les pièges ont été installés sur un point de la parcelle recevant de la lumière au moins quelques minutes par jour. Rarement, ils ont pu être correctement adossés à un obstacle (buisson, talus ...) comme il est nécessaire pour une étude ciblant précisément les hyménoptères.

Figure 1 : Pièges à Port-Vila, au centre, le piège Malaise.

Pour respecter les autres études, en particulier botaniques, les alentours des pièges n'ont pas été nettoyés de la végétation, le dessous ne l'a été que lorsque c'était strictement indispensable pour la pose du piège.

Les captures ne sont donc pas représentatives des espèces peuplant la forêt de la Comté, mais elles répondent aux exigences du protocole, qui exclut les zones ouvertes, telles les clairières, les coupes, les lisières, ainsi que les chemins et les coupes.

Le lieu

La mission IBISCA AUVERGNE porte sur la forêt dite "Bois de la Comté", située entre les communes de Sallèdes, Saint-Babel et Vic-le-Comte. Cette forêt, dont la plus grande part est propriété du conseil général du Puy-de-Dôme est caractérisée par des reliefs très accentués dont l'altitude varie entre 600 et 800 m environ, la plus grande part entre 650 et 700m

Le protocole a fixé vingt parcelles carrées de 400m², sans préciser l'orientation des côtés. Les points centraux, marqués d'une borne orange portant le nom de code de la parcelle, sont définis par des coordonnées de précision centimétrique. Toutefois, l'expérience sur le terrain nous a montré qu'il n'est pas possi-

ble de retrouver toutes les parcelles en utilisant les coordonnées, car l'exactitude des relevés est de l'ordre hectométrique. La carte de la page suivante n'est donc donnée qu'à titre indicatif.

J'ai utilisé cinq couleurs pour noter les types de milieux.

Le bleu indique les parcelles dites chênaie-charmaie, correspondant aux peuplements à feuilles décidues. Paris, Berlin, Rome, Londres.

Le jaune a été utilisé pour le même type de peuplement en milieu humide. Tokyo, Jakarta, New-Dehli, Lhassa.

Le noir indique le milieu dit "ravins thermophiles" désignant l'adret des reliefs. Abidjan, Nairobi, Dakar, Le Caire.

Vert pour les parcelles situées à l'ubac, où l'on s'attend à trouver des peuplements à caractère sciaphile. Papeete, Port-Vila, Sydney, Honolulu.

Le bistre marque les quatre parcelles situées dans les plantations de *Pseudotsuga menziesii* (Sapins de Douglas). Rio, Caracas, Mexico, New-York.

À ces points s'ajoute un point particulier, ne faisant pas partie de

l'étude, mais qui a été d'une importance capitale lors de cette mission: Il s'agit du camp de base, au lieu-dit "La Chaux-Montgros", sur la commune de Sallèdes. Sur la carte, on le trouve en limite nord, proche de la limite est. C'est dans le château de la Chaux-Montgros que le logement et le laboratoire étaient installés, dans des conditions qui auraient pu être catastrophiques eu égard à l'état de ce majestueux vestige chargé d'un beau passé qui a marqué l'histoire d'Auvergne, mais qui s'est montré assez perméable à une pluviosité exceptionnelle en juin 2008.

Ce n'est que par la contribution généreuse et bienveillante des élus et des habitants de Sallèdes que cette dure aventure est devenue supportable.

Un chaleureux merci à tous ceux qui nous ont aidé.

Résultats

On ne s'étonnera pas de l'extrême pauvreté qui s'explique par le protocole lui-même, mais aussi par une pluviosité exceptionnelle et un ensoleillement globalement très inférieur à la moyenne. Les observations antérieures de Frédéric Durand font état d'une richesse bien

Durée en jours →	23/04	12/05	26/05	09/06	23/06	06/07	20/07	03/08	17/08	31/08	21/09	05/10	25/10
Paris				0	?								
Berlin				0	?								
Rome				0	?								
Londres	2	0	2	2	1	0	4	4	13	5	0	11	
Tokyo				2	?								
Jakarta				4	0								
New-Dehli				1	?								
Lhassa	0	1	1	0	3	1	6	8	3	4	1	2	
Abidjan				6	?								
Nairobi				0	5								
Le Caire				1	2								
Dakar	1	2	1	8	5	1	5	9	12	7	1	?	
Papeete				2	?								
Sydney				2	?								
Honolulu				1	?								
Port-Vila	0	0	0	0	1	0	0	1	4	1	0	1	
Rio				2	?								
Mexico				9	?								
New-York				4	?								
Caracas	2	2	1	4	8	6	3	3	20	16	0	3	

Figure 3 : Synthèse des résultats obtenus par site.

CRABRONIDAE		<i>Passaloeocus insignis</i>	<i>Vespa crabro</i>	Lhassa 21/09	3		
<i>Crossocerus assimilis</i>	(F. Smith 1856)	(Vander Linden 1829)	Linné 1758	Lhassa 25/10	1♀		
Dakar 23/06	1♀	New-York 23/06	1♀	Dakar 23/06	1+1♀		
Dakar 06/07	1♀		Londres 31/08	3	Dakar 20/07	1	
			Londres 21/09	1	Dakar 03/08	4	
		<i>Pemphredon lugubris</i>	Londres 25/10	9	Dakar 17/08	6	
		(Fabricius 1793)	Tokyo 23/06	1♀	Dakar 31/08	5	
<i>Crossocerus cetratus</i>	(Shuckard 1837)	Londres 31/08	1♀	Lhassa 17/08	1	Dakar 31/08	5
New-York 23/06	1♀	Jakarta 23/06	2♀	Lhassa 31/08	1	Dakar 21/09	7
		Dakar 12/06	1♀	Lhassa 21/09	1	Dakar 05/10	1
		Rio 23/06	2♀	Lhassa 05/10	1	Papeete 23/06	2♀
		New-York 23/06	1♀	Lhassa 25/10	1	Sydney 23/06	2♀
		Caracas 23/06	1♀	Dakar 17/08	2	Honolulu 23/06	1♀
		Caracas 06/07	1♀	Dakar 31/08	3	Port-Vila 17/08	1
		Caracas 03/08	1♀	Port-Vila 21/09	1	Port-Vila 31/08	4
				Caracas 31/08	10	Port-Vila 25/10	1
<i>Crossocerus podagricus</i>	(Vander Linden 1829)	<i>Trypoxylon beaumonti</i>	Caracas 21/09	1	Mexico 23/06	6♀	
Nairobi 06/07	1♀	Antropov 1991			New-York 23/06	1♀	
Dakar 31/08	1♀	Nairobi 06/07	1♀		Caracas 12/05	1♀	
				<i>Vespula germanica</i>	Caracas 26/05	1♀	
				(Fabricius 1793)	Caracas 09/06	1♀	
		<i>Trypoxylon clavicerum</i>	Dakar 26/05	2♀	Caracas 23/06	1	
		Lepelletier & Serville	Dakar 23/06	1♀	Caracas 06/07	3	
		Tokyo 23/06	1♀	Dakar 31/08	1	Caracas 20/07	2
		Jakarta 23/06	1♀			Caracas 03/08	2
		Dakar 23/06	1♀	<i>Vespula rufa</i>	Caracas 17/08	2	
		Dakar 06/07	1♀	Linné 1758	Caracas 31/08	10	
		Mexico 23/06	1♀	Caracas 26/05	1♀	Caracas 21/09	14+1♀
		Port-Vila 06/07	1♀			Caracas 25/10	3
		Caracas 20/07	2♀	<i>Vespula vulgaris</i>			
		Caracas 17/08	1♀	Linné 1758			
				Londres 12/05	1♀		
		<i>Trypoxylon figulus</i>	Londres 09/06	2♀		EUMENINAE	
		(Linné 1758)	Londres 23/06	2♀	Londres 12/05	1	
		Le Caire 06/07	1♀	Londres 03/08	4	Abidjan 23/06	4
		Dakar 06/07	1♀	Londres 17/08	4	Le Caire 23/06	1
		Caracas 20/07	1♀	Londres 31/08	9	Dakar 09/06	1
				Londres 21/09	4	Dakar 23/06	2
		<i>Trypoxylon minus</i>	Londres 25/10	2	Dakar 06/07	1	
		Beaumont 1948	Tokyo 23/06	1♀	Caracas 06/07	1	
		Caracas 06/07	2♂	Jakarta 23/06	1♀		
				New-Dehli 23/06	1♀		
				Lhassa 26/05	1♀	CHRYSIDIDAE	
				Lhassa 09/06	1♀	Londres 23/06	1
				Lhassa 06/07	3	Abidjan 23/06	1
				Lhassa 20/07	1	Dakar 06/07	2
				Lhassa 03/08	6	Dakar 17/08	1
				Lhassa 17/08	7	Dakar 31/08	1
				Lhassa 31/08	2	Caracas 23/06	1
		VESPINAE					
		<i>Dolichovespula saxonica</i>	(Fabricius 1793)				
		Abidjan 23/06	1♀	Caracas 12/05	1♀		
		Le Caire 06/07	1♀				

Figure 4 : Liste des espèces.

plus importante, échappant au protocole, puisque celui-ci exclut les milieux ouverts.

En particulier, on notera l'absence totale d'Ampulicidae et de Sphecidae.

Les quelques espèces de Crabronidae présentes n'en sont pas moins intéressantes, car ce sont justement celles qui sont visées par le protocole, celles qui sont capables de s'activer sous couvert, assez loin des espaces ensoleillés: Les espèces mieux adaptées que d'autres au milieu forestier fermé.

Le tableau général qui suit, donne une idée globale des populations d'hyménoptères prédateurs, en nombre d'individus, pour les cinq familles étudiées ici. On y trouvera la date de début et de fin, ainsi que les dates intermédiaires pour chacun des sites.

On constate, contre toute attente, que les parcelles les plus riches en nombre d'individus sont situées dans les plantations de conifères. Certaines de ces parcelles montrent aussi une bonne diversité.

Le site "Caracas", dans la zone de résineux, s'avère le plus riche en nombre d'espèces.

Ces résultats surprenants sont à prendre avec prudence, tenant compte de certains facteurs particuliers. Tout d'abord, l'ensoleillement

global des parcelles au niveau du sol, mais aussi, la durée de l'ensoleillement sur les pièges eux même. En effet, si par définition, il n'était pas possible d'optimiser ce paramètre pour les parcelles "sciaphiles", la topographie de la parcelle "Lhassa", n'a pas permis une installation correcte du dispositif.

Les conditions sont toutefois assez comparables pour "Londres", "Dakar" et "Caracas".

Il faut aussi savoir que si "Londres" est loin d'être le plus riche pour les familles ici considérées, il en va tout autrement pour les Pompiles.

Les crabronidae

Il n'y a rien de surprenant à la présence de *Gorytes planifrons* et d'*Argogorytes mystaceus*, celui-ci est commun, présent dans la plupart des forêts françaises, celui-là, assez rare globalement, est plutôt commun dans les forêts d'Auvergne, Cantal exclu. Ce sont des prédateurs d'hyménoptères, *Issus coleoptratus* (Fulgo-

Gorytes planifrons

romorphe) pour le premier, et *Philaenus spumarius* (Cicadomorphe) pour le second. Tous deux sont terricoles.

Quatre espèces d'*Ectemnius* fréquentent les sites "thermophiles", ainsi que "Londres", assez ouvert et ensoleillé. Le matériel qui ne nous est pas revenu correspondant à une période chaude et ensoleillée, suivant un mois de pluie et au paroxysme de l'activité de ces espèces héliophiles, aurait peut-être révélé leur présence sur d'autres sites. Toutes sont xylocoles et prédatrices de diptères.

Hormis *E.ruficornis* qui est absent de nombreux départements, les autres sont communs partout en France.

Pempredon lugubris

Passaloecus insignis est xylicole et prédateur de pucerons, tout comme *Pempredon lugubris*. Ce sont des hôtes habituels des peuplements arbustifs, voire des haies, y compris

celles des villes pour le second. Leur rôle dans la régulation des aphididae est considérable. Le second est commun, le premier n'a rien de rare en Auvergne, mais il manque de bien des départements.

Les *Trypoxylons* peuplent le même type de milieu que les deux espèces précédentes. Prédateurs de petites araignées immatures, ils utilisent des cavités existantes pour nicher: Sol, tiges, trous abandonnés de xylocoles.

Trypoxylon figulus

Trois des espèces trouvées sont des plus banales. Par contre *Trypoxylon beaumonti* n'est répertorié que de trente-et-un départements de France continentale et serait nouveau pour la région Auvergne, sans la capture le 28 août 2005 par Frédéric Durand, d'une femelle de cette espèce sur la commune de Mazoires, lors de l'inventaire de la réserve naturelle de la Jaquette, dans le Puy-de-Dôme.

Je terminerai par le genre *Crossoce-*
rus qui m'a paru particulièrement
digne d'intérêt dans le cadre de cette
approche de l'écologie forestière.

L'étude plus approfondie de ces hô-
tes de la sylve, prédateurs de diptè-
res, aux mœurs xylocoles, et pour
certains, partiellement rubicoles,
me semble fort importante pour la
compréhension intime de ces mi-
lieux complexes.

Deux d'entre eux sont relative-
ment communs un peu partout en
France, il s'agit de *Crossocerus poda-*
gricus et de *Crossocerus megacepha-*
lus. Toutefois, pour ce dernier pour-
tant connu de trois départements
d'Auvergne, ce n'est que la deuxième
citation pour le Puy-de-Dôme,

après celle de Frédéric Durand, La
Roche-Noire, 15 mai 1993.

Quant à *Crossocerus assimilis* et
Crossocerus cetratus, ce sont des es-
pèces typiques des forêts de moyen-
ne altitude. Le second est bien
présent sur les reliefs orientaux de
la France mais aussi sur le Massif
Central et l'est des Pyrénées. Le pre-
mier est beaucoup moins répandu,
et hormis sa présence inattendue en
Gironde, il n'est banal qu'à l'est du
pays. Sa présence en Auvergne est
donc une nouveauté qui va plus loin
que le simple plaisir de la décou-
verte, dénotant d'une richesse mé-
connue qui mérite d'être préservée
et mieux étudiée.