Choreutis nemorana (Hübner, [1799]) en Auvergne (Lepidoptera, Choreutidae)

François Fournier, *25, rue de la Treille F.63000*

L'article très complet de G. Chr. Luquet (2010) sur l'extension de l'aire de répartition de *Choreutis nemorana* Hb.en France ne situe pas sa présence en Auvergne.

En 2009 dans mon jardin à Brenat (Puy-de-Dôme) j'observai pour la première fois la chenille et plusieurs feuilles minées. Malgré un hiver rigoureux où la plupart de branches du figuier ont gelé, j'ai retrouvé cette année de nombreuses chenilles et obtenus plusieurs imagos fin septembre 2010.

J'ai donc recherché l'espèce sur d'autres figuiers dans les jardins voisins et dans les environs de Brenat sans résultat. Un figuier ancien se trouve dans le jardin mitoyen et ne porte aucune trace de la chenille. Dans le jardin de mon grand-père à Saint-Germain-Lembron (Puy-de-Dôme) où j'ai débuté l'entomologie, jamais je n'avais observé la présence de l'espèce sur ce très vieux figuier plus que centenaire et qui ne semble toujours pas contaminé.

Aucune trace non plus à Clermont-Ferrand, Aubière, mais par contre une observation à La Roche-Blanche.

Mes recherches m'ont entraîné en Haute-Loire où dans la vallée de l'Allier à Saint-Ilpize j'observai cette année un arbre dont les feuilles étaient attaquées par les chenilles.

Il reste bien sûr encore beaucoup de sites à inspecter pour analyser sa réelle répartition, mais les conditions de son arrivée en Auvergne restent à définir. Si le réchauffement climatique est plausible, une autre raison s'est offerte à moi en visitant des jardineries des environs de Clermont-Ferrand, en septembre 2010 où, à mon grand étonnement, plusieurs plants de figuier en vente présentaient des feuilles minées…

Il se pose la question que relève aussi Luquet avec plusieurs observations similaires : pourquoi

des figuiers peu éloignés ne sont pas attaqués ? La chenille a-t-elle une préférence pour certaines variétés de figuiers ? Les nouvelles variétés hybrides seraient elles plus attractives pour l'espèce ?

J'incite toutes les personnes qui le souhaitent à me faire parvenir leurs observations négatives comme positives pour suivre sa répartition en Auvergne. Si l'imago est difficile à observer, la présence des chenilles est facilement visible : les feuilles de figuiers sont minées sur le dessus et la chenille tisse une toile dans laquelle elle se réfugie. Elle se chrysalide en formant un cocon blanc en roulant le bord d'une feuille.

Référence :

Luquet Gérard Chr. 2010 propos sur l'extension de l'aire de répartition de (Hübner, [1799]) dans la moitié nord de la France. *Alexanor*, **23** (6) 2004 (2010) : 345-367.

Feuille de figuier minée (cliché F. Fournier).

Choreutis nemorana Hb. Brenat (cliché F. Fournier).

Chrysalide de *C. nemorana* Hb (cliché F. Fournier).